

LUBOFOS® 12 MAKS

NAWÓZ WE ■ GRANULOWANY ■ TYP B.4.
PK (Ca, Mg, S) 12-25-(2-2,5-6)



NOWOŚĆ OD LUVENA S.A.



www.nawozy.pl

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń | Wydział Handlu Nawozami: tel. 61 8900 200 | Rejestr BDO nr 000007005



NOWOŚĆ OD LUVENA S.A.

LUBOFOS® 12 MAKS

NAWÓZ WE ▪ GRANULOWANY ▪ TYP B.4.
PK (Ca, Mg, S) 12-25-(2-2,5-6)



- nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez
- ze względu na wysoką zawartość potasu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwałe użytki zielone)
- ze względu na zawarty magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
- zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników



GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa 1,000 do 1,050 kg/dm³.
Aktualny Certyfikat Zgodności dostępny na stronie www.nawozy.pl



WŁAŚCIWOŚCI


12%	pięciotlenku fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
25%	tlenku potasu (K ₂ O) rozpuszczalnego w wodzie
2%	tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
2,5%	tlenku magnezu (MgO) całkowitego
6%	trójtlenku siarki (SO ₃) całkowitego



STOSOWANIE

Na trwałych użytkach zielonych wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszej dawki wczesną wiosną, a drugiej po zbiorze pierwszego pokosu lub po pierwszym wypasie. Nawóz powinien być polecany do nawożenia w zmianowaniu, celem korekty zasobności gleby dla najbardziej wymagającej rośliny. Zmieszać z glebą do głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.

Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów takich jak:



DAWKOWANIE [kg/ha]



Nawożone rośliny	Plon t/ha	Zawartość fosforu i potasu przyswajalnego w glebie		
		niska	średnia	wysoka
zboża ozime	6,0	500	350-400	250
zboża jare	5,0	450	300-350	200
rzepak ozimy	3,5	600	450-500	250
burak cukrowy (na oborniku)	50,0	600*	400	250
ziemniak (na oborniku)	30,0	500	350	250
kukurydza na ziarno	8,0	700	500-550	300
strączkowe na ziarno	3,0	400	300	200
siano łąkowe	6,0	600	450	300
motylkowe z trawami - zielonka	50,0	700	550	350
trawy w uprawie polowej - zielonka	45,0	700	500	300

* ryzyko uprawy

w: 1118